





201. 4 H

	<b>Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu</b>	Wydanie: 1
		Obowiązuje od dnia 05.04.2012r
Procedura nr 59	<b>PIEŁĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE</b>	Strona 1 z 3

**„PRAWIDŁOWY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  
ROZTWORÓW ROBOCZYCH ŚRODKÓW  
DEZYNFEKCYJNYCH**

<b>Sporządziły:</b>		<b>Sprawdził:</b>	
Pielegniarki Epidemiologiczne: Alicja Bańdur Ewa Wiktor		Z – ca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Fugiel	
<b>Data:</b> 02.04.12	<b>Podpis:</b> 	<b>Data:</b> 02.04.12	<b>Podpis:</b> ds. lecznictwa 

<b>Zatwierdził:</b>	
<b>Dyrektor Szpitala:</b> Artur Puszeko	
<b>Data:</b> 02.04.12	<b>Podpis:</b> D Y R E K T O R SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  lek. med. Artur Puszeko



## **CEL:**

- Ochrona zdrowia personelu i pacjentów
- Profilaktyka zakażeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

## **PROCEDURA DOTYCZY:**

- Pielęgniarek,
- Położnych
- Personelu sprząającego

## **OBOWIAZUJACY TOK POSTĘPOWANIA:**

1. Załóż odzież ochronną.
2. Dobierz środek dezynfekcyjny do skuteczności adekwatnej do występujących zagrożeń.
3. Przygotuj środek dezynfekcyjny, pojemnik do dezynfekcji i miarki.
4. Sporządź roztwór pamiętając o kolejności rozcieńczania (najpierw woda później koncentrat), oraz prawidłowym stężeniu.
5. Opisz pojemnik z roztworem środka dezynfekcyjnego:
  - nazwa środka dezynfekcyjnego
  - stężenie
  - data i godzina sporządzenia roztworu
  - podpis osoby sporządzającej roztwór
6. Oryginalne opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym umieść ponownie w zamkniętej szafce przeznaczonej do tego celu.
7. Przeprowadź dezynfekcję dotrzymując warunków kontaktu narzędzi lub powierzchni z roztworem środka dezynfekcyjnego (czas dezynfekcji).
8. Po przeprowadzonej dezynfekcji wylej roztwór środka dezynfekcyjnego do kanalizacji.
9. Pojemnik poddaj dezynfekcji, myciu.
10. Zdejmij odzież ochronną.
11. Umyj i zdezynfekuj ręce
12. Pojemnik przechowuj suchy w miejscu przeznaczonym do tego celu.

## UWAGI!!!

- Każdy pracownik powinien być zapoznany z kartą charakterystyki preparatów dezynfekcyjnych oraz z przepisami BHP.
- Nie wolno wylewać do kanalizacji koncentratów środków dezynfekcyjnych.
- Preparaty dezynfekcyjne należy magazynować w oddzielnym pomieszczeniu, w zamkniętych szafkach w oryginalnych opakowaniach z czytelnymi, estetycznymi etykietkami w języku polskim.
- W przypadku dezynfekcji przez zanurzenie nie należy przedłużać jej w czasie ponad niezbędny od skutecznego działania a pojemniki szczelnie zamykać.
- Stosując środki dezynfekcyjne należy zwracać uwagę na termin ich ważności.
- Zabrania się mieszania różnych środków dezynfekcyjnych oraz dodawania do nich detergentów.